


რა უნდა იცოდეს ჯანდაცვის მუშაკმა
ტუბერკულოზში სავაჭვო სიმპტომების
მქონე პაციენტების მომსახურების დროს





- ტუბერკულოზისთვის დამახასიათებელი სიმპტომების მქონე ყველა პაციენტს ჩაუტარეთ რუტინული სკრინინგი ტუბერკულოზზე
- განაცალკევით ხველის სიმპტომის მქონე ყველა პაციენტი ტბ დიაგნოსტიკის გატარებამდე
- სამედიცინო ეთიკის დაცვით მიაწოდეთ პაციენტს სრულყოფილი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რატომ არის აუცილებელი გატარდეს მის მიმართ ტრიაჟის ღონისძიებები
- პაციენტები, რომელთა ტუბერკულოზის დიაგნოზი ცნობილია ან არსებობს მასზე ეჭვი, მოათავსეთ ოთახში ან გარე სივრცეში, სხვა პაციენტებისგან იზოლირებულად
- იზოლაციის ზომები განსაკუთრებით მკაცრად დაიცავით აივ-ინფექცია/შიდსის მქონე პაციენტებისა და სხვა იმუნოკომპრომენტირებული პირების მიმართ
- მიაწოდეთ ინფორმაცია პაციენტს და მის მნახველებს იზოლირების აუცილებლობის შესახებ;

ფილტვის ტუბერკულოზისთვის დამახასიათებელი გოგადი კლინიკური ნიშნები



- 2 კვირაზე მეტი ხანძლივობის ხველა
- თემპერატურის მომატება
- სისხლიანი ნახველი
- წონაში კლება
- საერთო სისუსტე
- ღამით ოფლიანობა
- ტკივილი გულმკერდის არეში
- უშადობა




ხველის ეტიკეტი

- ✓ პაციენტებს და ვიზიტორებს მიაწოდეთ ინსტრუქცია, რომ პირი შეაქციონ სხვა პირებს ხველისა და ცემინების დროს, პირისა და ცხვირის დასაფარად გამოიყენონ რაიმე სახის ქსოვილი-ცხვირსახოცი, ერთჯერადი ხელსახოცი (უკიდურეს შემთხვევაში ცხვირ-პირზე მოხრილი იდაყვი მიიფარონ) ან გამოიყენონ ნილაბი
- ✓ ერთჯერადი ნილების გამოყენება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როდესაც პაციენტი მოძრაობს შენობაში
- ✓ მიეცით სწორი რესპირაციულ-ჰიგიენური ქცევის მაგალითი პაციენტს, ვიზიტორსა თუ კოლეგას ხველის ეტიკეტის დაცვაში



- ✓ ტბ საექვო და ფილტვის ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტს მიაწოდეთ ერთჯერადი ჰიგიენური საწმენდები და ნიღბები
- ✓ რეგულარულად შეახსენეთ პაციენტებს, რომ დაიცვან დაწესებულების რესპირაციული ჰიგიენის წესები
- ✓ შეამცირეთ ტუბერკულოზზე საექვო ან ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტების დაყოვნება სამედიცინო დაწესებულებაში, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ჰოსპიტალიზაციის აუცილებელ ჩვენებას წარმოადგენს



დანახებულაბაში პაციენტის დაყოვნების შემცირება ამცირებს ტუბერკულოზის გადაცემის რისკს

ამისათვის

- ა) უზრუნველყოფით ტბ საექვო ან დაავადებული პაციენტებისთვის სამედიცინო სერვისის ურიგოდ მიწოდება
- ბ) შეამცირეთ ტბ საექვო ან დაავადებული პაციენტის ლოდინისა და საკონსულტაციო დრო
- გ) არ მოახდინოთ ტბ საექვო ან დაავადებული პაციენტის ჰოსპიტალიზაცია აბსოლუტური აუცილებლობის გარეშე



თუ თქვენს სამედიცინო დაწესებულებაში გამოიყენება ბუნებრივი ვენტილაცია (ანუ გარემოდან სუფთა ჰაერის შემოდინების უზრუნველსაყოფად გამოიყენება ღია კარებები, ფანჯრები და სხვა ღიობები. პროპელერიანი ვენტილატორებიც შეიძლება ამ ტიპის ვენტილაციაში ვიგულისხმოთ), დაცავით შემდეგი წესები:

- ✓ ტუბერკულოზზე საექვო პირი განათავსეთ ჰაერის ნაკადის გადინებასთან ახლოს
- ✓ ჯანდაცვის მუშაკი უნდა იჯდეს სუფთა ჰაერის შემოდინების წყაროსთან, ხოლო პაციენტი კი – ჰაერის გარეთ გადინების წყაროსთან
- ✓ ამ პრინციპის დაცვა თავიდან აგვარიდებს ტუბერკულოზის მიმართ ექსპოზიციას, მაგალითად, პაციენტის კონსულტირების პროცესში





USAID
ამერიკელი ხალხისგან

ბიჯარაულოზის
პრეპენციის
პროექტი

UNIVERSITY RESEARCH Co., LLC
50 JRC
years



ჯანმრთელობის კვლევის კავშირი
HEALTH RESEARCH UNION

სამართველო, 0177, თბილისი, ნუსუბიძის ქ.8

www.hru.ge

ელ-ფოსტა: info@hru.ge

ტელ: 2144447