

## აივ ინფექციის პროტოკოლი

ექსპოზიციულ ჟანდაცვის მუშავებში აივ ინფექციის პროტოკოლი კისთვის გამოიყენება სპეციფიური ანტირეტროვირუსული პრეპარატები, რომელთა მიღება უნდა იქნას დაწყებული რაც შეიძლება ადრე, არა უგვიანეს 36 საათისა. მედიკამენტების დანიშვნისთვის და შემდგომი მონიტორინგისთვის აუცილებელია სპეციალისტის მეთვალყურეობის ქვეშ ყოფნა.

ითორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:  
რეაბილიტაციის ცენტრი, ქალთა და ბავშვთა დაცვის კავშირი  
თბილისი, 0160, ვაჟა-ფშაველას 18ა, მე-5 სართ.

ტელ: 320303, 390142

## B ჰეპატიტის პროტოკოლი

თუ ჟანდაცვის მუშავი არ არის ვაქცინირებული B ჰეპატიტი, დაუყოვნებლივ:

- ა) გაუკეთდეს B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო იმუნოგლობულინი (ეს პრეპარატი ამჟამად საქართველოში არ არის ხელმისაწვდომი)
- ბ) დაიწყოს B ჰეპატიტზე ვაქცინაცია.

თუ ჟანდაცვის მუშავი ვაქცინირებულია B ჰეპატიტზე:  
ჩაუტარდეს გამოკვლევა ანტიHBs -ზე.

- ა) თუ დადებითია, არავითარ ჩარევას აღარ საჭიროებს და B ჰეპატიტის ვირუსით ინფიცირების რისკი აღარ არსებობს
- ბ) თუ უარყოფითია, ვუკეთებთ იმუნოგლობულინს და ვაქცინას.

## C ჰეპატიტის პროტოკოლი

## როგორ დავიცვათ თავი სისხლით გზით გაღამლაზე ინფექციისაგან

ამჟამად არ არსებობს C ჰეპატიტის სპეციფიკური პროტოკოლები:

- ა) გაუკეთდეს C ჰეპატიტის საწინააღმდეგო იმუნოგლობულინი (ეს პრეპარატი ამჟამად საქართველოში არ არის ხელმისაწვდომი)
- ბ) დაიწყოს C ჰეპატიტზე ვაქცინაცია.

თუ ჟანდაცვის მუშავი ვაქცინირებულია C ჰეპატიტზე:  
ჩაუტარდეს გამოკვლევა ანტიHBc -ზე.

- ა) თუ დადებითია, არავითარ ჩარევას აღარ საჭიროებს და C ჰეპატიტის ვირუსით ინფიცირების რისკი აღარ არსებობს

ბ) თუ უარყოფითია, ვუკეთებთ იმუნოგლობულინს და ვაქცინას.

უფრო ადრეული დიაგნოსტიკისთვის HCV რნმ-ზე გამოკვლევა შესაძლებელია ექსპოზირებიდან 4-6 კვირაში.  
გამოკვლევის ჩატარებამდე ექსპოზირებულმა ჟანდაცვის მუშავა  
თავი უნდა შეიკავოს დონორობისგან.

- სიფრთხილით მოვეკიდოთ გასრ ინსტრუმენტებს
  - ნემსის ან გასრი ინსტრუმენტის გამოყენებამდე დავრწმუნდეთ, რომ კონტეინერი, რომელშიც იგი გამოყენების შემდეგ უნდა მოთავსდეს, იქვე, ახლოს დევს
  - გამოყენებისთანავე მოვათავსოთ სპეციალურ კონტეინერში
  - მაქსიმალურად გამოვიყენოთ უსაფრთხო ნემსები და სისტემები



კანდაცვის მუშაკების ინფიცირების  
ერთ-ერთი ხშირი მიზანია გამოყ-  
ენალ ნემსი თავსახურის მორგება.  
ამის მიზანი კი უმრავლეს შემთხვევაში  
არის ის, რომ ახლოს არ იმყოფება  
შესაბამისი კონტაქტი, რომელიც  
ნახმარი ნემსი თავსახურის ნამოცვის  
გარეშე უდეა მოთავსდეს.

როგორ მოვიქცეთ ნემსის ჩხვლეტის ან კანის/ლორწოვანი  
გარსების სისხლით დასვრის შემთხვევაში

- პაციენტთან კონტაქტის შემდეგ გულდასმით დავიგანოთ ხელები (თუნდაც ხელთათმანის სმარების შემთხვევაში)
- სისხლთან ნებისმიერი შეხებისას გამოვიყენოთ ხელთათმანი
- ნემსის ჩხვლეტის შემთხვევაში ნაჩხვლეტიდან გამოვიდინოთ სისხლის მაქსიმალური რაოდენობა
- დაზიანებული კანი ყოველთვის დაფარული გვქონდეს წყალგაუმტარი საფენით
- ნაჩხვლეტი ან სისხლით და-  
ვრილი კანი დავიგანოთ თბილი  
წყლით და საპნით
- დასვრილი თეთრეულის ტრანსპორტირება მოხდეს მხოლოდ მჭიდროდ დახურული წყალგაუმტარი ჩანთით ან პაკეტით
- სისხლის თვალში შეშეფების შემ-  
თხვევაში გულდასმით დავიგანოთ თვალი ცივი წყლით ან ფიზიოლო-  
გიური ხსნარით

