



დაცებით შეღას (ანუ ალმორჩება ვიხესის სანინაალმეგო ანტი-სხეულები), ტახება დამაღასუჟებელი ბა- მოკვლევა უფრო ჩოული და მაღალტექნოლოგი- ჰი მეთოდით. დამაღასუჟებელი მეთოდით გამოკ- ლევა აუცილებელია ასევე პირველი ანალიზის ჩატა- ხებისას საეჭვო შეღების მიღების შემთხვევაში.

ასებობს თუ ას შიგნის სამკურნალო საშუალება?

საღლუისოდ მსოფლიოში ას ასებობს შიგნის სანინაალმეგო ვაკცინა, ასე ჩამო ისეთი სამკურ- ნალო საშუალება, რომელიც აღმართს შიგნისგან სხეულე განკურნავს. თუმცა, ასებობს წამლები, რომელიც შიგნის მქონე ავაღმყოფებს მნიშვნე- ლოვნად ეხანგრძლივებს სიცოლებეს და აუმჯობესებს მათი სიცოლეების ხასისებს.

მოზანშენონირია თუ ას მჩერის კონსერუატიულია ან ინფექცია/შიგნის პარანიოზიან ებთან?

მჩერეს ან ინფექცია/შიგნის კონსერუატიულია უმჯობესია ჩაუკარის პარანიოზის პარანიოზიან ებთან. საქა- თველოში ამეამად მიმღინაჲებს წალენება, რომელის მიზანია ღამის მართვა ან ინფექციაზე წყვილებზე მიმღინაჲები კონსერუატიული არ არის და აუმჯობესების გავლენა ჩამოღირების და სკესობის ჯანმრთელობაზე.



आशान, उत्तरी, शिक्षण आणि पालकात्मक
या विषयातील विशेष प्रयत्न



Elizabeth Glazer pediatric AIDS Foundation



ქალთა და ბავშვთა დაცვის კავშირი

ვაკა-ფარმაცეტუალას 18ა

ტელ: 311125

www.mccu.ge

აივ ინფეცია / შიგნი

ხშირი დასმული შეკითხვები
შიგნის შესახებ



შიგნი ეს მჩერის

ას აზის შიგნი?

შეძენილი იმუნოეფიციუსის სიღრმო -- შიგნი აზის ინფექციური ღავაღება და მისი გამომწვევა აღმართის იმუნოეფიციუსის ვიჟუსი (აივ).

ას აზიანებს შიგნის ვიჟუსი?

აივ ძინათადად აზიანებს ჩვენი ოჩანიზმის დამკვერცხით სისტემას, სიმედისაც ჰქვია იმუნური სისტემა, ამიტომ შიგნის მქონე აღმართებს ჰმობებულის უვეითოებათ ინფექციების წინააღმდეგ ბრძოლის უნახო.

როგორი სიმპტომები აქვს აივ ინფექციას?

ვიჟუსის მიგანიზმში შეჭრილი ღიღი ხნის მანძილზე აღმართ შეიძლება აჩვითაში სიმპტომი ან ჰქონდება და თავს სხერიად ჯანმრთელად გაძნებებებს. ასეთი მდგომარეობა შეიძლება გაძარებელს 5-10 წლის განმავლობაში და მეტანასაც. თუმცა, ამ ღმს თუ გამოვიკვლევთ მის სისხლს, აღმოვარენთ, ჩოდნი იგი ინფიცირებულია აღმართის იმუნოეფიციუსი ვიჟუსით.

წლების შემდეგ შეიძლება განვითარება ისეთი გამოვინებები, როგორიცაა საექთო სისუსტე, თვევიანობა, ღიმფები ჲვანძების გაღირება, თეთი ნაები ენაზე, ნითერი ღაქები და ჲვანძები ჲანზე და ცონივანზე, ნონაში ჲება, გახანგიძილვებები ხვერა, გახანგიძილვებები ფალათი და სხვა. თუმცა, ჩაგანას ყველა ეს სიმპტომი ბევრი სხვა ღავაღებებისთვისაც აზის დამახასიათებელი, ამიტომ შიგნის ღიგნონობის ღასმა შესაძლებელია მხოლოდ სისხლის ღაბორაციონი გამოკვლევით.



როგორ ხდება აივ ინფექციის გადაცემა?

- სესონარივი კონტაქტით
- აივ ინფიცირებული სისხლის ან სისხლის ჰმობების გაღასხმით
- აჩასტერიტი ნემსის, შპერიტის ან სხვა ჰმორიმე სამეცინო ინსტუმენტის გამოყნებით
- ღერილ ბავშვზე მისამართის, მშობიარობის და ძებული კვების ღმს

შიგნი და მისებობა

ას საჭიროა მისებობის ქადაცევა?

მისებობის ქადაცევა გამოკვლევა აუცილებელია იმის მიური, ჩოდნი ღიგნი აღმორება ვიჟუსი, ექიმების მიური მას ღაენიშნება სათანადო მეტანარება და მისებობა სათანადო ჩრევები, ჩათა მინიმუმმდე იქნას ღავანილი ბავშვის ინფიცირების აღათობა.

თუკი ქადაცები უმის ეთმობელია, ას აქვს შემთხვევითი სესონარივი კავშირები, ღახმინებელია უმის ეთმობელი შესაბამის, ას ნახეობის იურთებს, საიდან უნდა ჰქონდეს მას აივ ინფექცია?

აივ ინფექციის აღათობა აქვს ყველა იმ აღმართ შემედისაც თელამე ჩაუკარების სამეცინო მანიპულაცია. გახდა ამისა, მეუღლის ამჟამინდერი ეთმობელია ას გამომიცხავს მის ქონინებამდე შემთხვევით სესონარივ ჲონტაქტებს და ამიტომ მიმის გაჩანცია, ჩოდნი მას ეს ვიჟუსი ას ექნება, ას აზიანობას.

თუ მისებობა აღმორება შიგნის ვიჟუსი, აუცილებელ უნდა მოიციროს ნაკუთი თუ ას.

ას თქმა უნდა ამის აუცილებობა ას აზიანობას, თუმცა ეს მთლიანად ქადასანყველია.

თუ მისებობა აღმორება შიგნის ვიჟუსი,

ნიშნავს თუ ას ეს იმას, ჩოდნი თუ ქადაცები მეტანარება ას ჩაუკარება, ბავშვი აუცილებელი ინფიცირებული ღაიბაღება?



აზიანობას თუ ას ვიჟუსი ბავშვზე გადაცემის ჩისეუ ძებული კვების ღმს?

ძებული კვების ვიჟუსის გადაცემის ჩისეუ საკმაოდ მაღალია (14%). ამიტომ აივ ინფიცირებული ქადაცევას ეძლევათ ჩრევებისაც, ბავშვი კვებონ ხელოვნები განვითარება.

როგორ ხდება შიგნის გამოკვლევა?

შიგნის გამოკვლევა ხდება ვენილან ალებელი სისხლის სპეციალის ანალიზით. თუ აღმართი ინფიცირებულია, სისხლში აღმორება შიგნის ვიჟუსის სანინაალებო ნანილაკები ე. ჩ. ანტისენერები. ეს ანტისენერები სისხლში გამომეშვება ვიჟუსის მიგანიზმში მოხვერილ 6-8 კვისაში. ამიტომ შიგნის გამოკვლევა უნდა მოხდეს ვიჟუსის სისხლში შეჭრის შესაძლო მომენტიდან მინიმუმ თუ მოხვერილ გავიღის შემდეგ.



უნდა მოხდეს ვიჟუსის სისხლში შეჭრის შესაძლო მომენტიდან მინიმუმ თუ მოხვერილ გავიღის შემდეგ.

ჩოდნელი ჰიპერეარენიზმი ანალიზით მიღებელი ეაჟიმოვთი შეღები (ეაჟიმოვთი ნიშნავს, ჩოდნი ანტისენერები ას აღმორება, ანუ აღმართი ას აზის ინფიცირებული), ღამაღასუებელი გამოკვლევა აღას ჰაქება. ხოლო თუ ჰიპერეარენიზმი გამოკვლევით მივიღებთ